



Informed consent nierbiopsie

Geachte heer, mevrouw

Bij u werd recent een nierziekte vastgesteld of u bent er al langer mee gekend. Om het juiste type nierziekte te achterhalen en om de zinvolheid en mogelijkheid van een specifieke behandeling in te schatten, heeft uw arts voorgesteld een nierbiopsie te laten uitvoeren.

Tijdens deze procedure wordt door middel van een naald een klein stukje nierweefsel verwijderd, zodat dit onder de microscoop bekeken kan worden. Dit gebeurt onder lokale verdoving. Terwijl men prikt, wordt continu met echografie de juiste ligging van de nieren bekeken. Omdat in de nier veel bloedvaten zitten, bestaat er altijd een kleine kans op een nierbloeding achteraf. Meestal betreft het een kleine bloeding, die gepaard kan gaan met lokale pijn en ongemak. In zeldzame gevallen echter (risico < 1 %) kan er een belangrijke bloeding optreden waarvoor bloedtransfusie nodig is. In het ergste geval is een ingreep nodig om de bloeding te stoppen.

Omdat het risico van bloeding zich voordoet binnen de eerste 24 uren na de nierbiopsie, wordt voorgesteld om 24 uur strikte bedrust te houden. Om het risico op een bloeding zo klein mogelijk te houden, wordt de nierbiopsie niet verricht wanneer u sterke bloedverdunnende medicatie hebt ingenomen. Gelieve daarom uw arts op de hoogte te stellen van alle bloedverdunnende medicatie die u inneemt. Het is ook goed om weten dat bij een ernstig verhoogde bloeddruk de nierbiopsie kan worden uitgesteld.

Ik verklaar dat deze informatie werd toegelicht door mijn behandelende nefroloog en dat ik alles goed begrepen heb.

Naam van patiënt, handtekening en datum :